

Bergerac



Kruising: Vitelotte Noir x BH 98-180

Algemene eigenschappen

Marktsegment	Specialty, versmarkt
Rijptijd	Midden
Loofontwikkeling	Weinig loof
Bladtype	Spits, diepnervig en smal
Bloemkleur	Paars
Aantal bloemen	Gemiddeld
Aantal bessen	Laag
Schilkleur	Paars
Vleeskleur	Paars
Knolvorm	Lang-ovaal
Knolaantal	Gemiddeld tot goed
Uniformiteit sortering	Uniform
Kiemrust	Kort
Diepte van de ogen	Iets diep
Grootte van de knollen	Fijn
Drogestofgehalte	19.2 (340)
Opbrengst	Gemiddeld
Kooktype	B-BC

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas	Redelijk gevoelig
Blauwgevoeligheid	Weinig gevoelig
Groeischeuren	Weinig gevoelig
Rooibeschatiging	Weinig gevoelig
Grondtype	Lichtere gronden hebben de voorkeur

Resistenties

Virus -Bladrol	Weinig gevoelig
Virus- Yn	Gevoelig, goed zichtbaar
Virus -Yntn (Knol)	Weinig gevoelig
AM RO 1/4	Vatbaar
AM RO 2/3	Vatbaar
AM RO 5	Vatbaar
AM PA 2	Vatbaar
AM PA 3	Vatbaar
Metribuzin voor opkomst	Weinig gevoelig
Metribuzin na opkomst	Matig gevoelig
Kringerigheid	Weinig gevoelig
Phytophthora loof	Gevoelig
Phytophthora knol	Gevoelig
Zilverschurft	Gevoelig
Fusarium	Gevoelig
Schurft	Gevoelig
Poederschurft	Gevoelig
Zwarte Spikkel	Gevoelig

Advies (pootgoed)

Stikstof	Standaardadvies +10%
Fosfaat	Standaardadvies
Kalium	Standaardadvies
Sporenelementen	Standaardadvies (gebruik is aan te bevelen)
Talent	+/-
Ethyleen	+/-
Voorkiemen	+/-
Afkiemen	--
Bewaaradvies	+/- 5-7 graden Celsius
Plantafstand 28/35	80.000/ha (16.6 cm)
Plantafstand 35/55	66.666/ha (20 cm)
Plantafstand 55/65	50.000/ha (27 cm)
Pootdiepte	Maaiveld, knollen groeien diep