

Toronto



Kruising: AO92-021 x BRU93-136

Algemene eigenschappen

Marktsegment	QSR-industrie, versmarkt/export
Rijptijd	Midden
Loofontwikkeling	Goede loofontwikkeling
Bladtype	Breed, vlaknervig
Bloemkleur	Wit
Aantal bloemen	Hoog
Aantal bessen	Hoog
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Lichtgeel
Knolvorm	Lang-ovaal
Knolaantal	Gemiddeld tot goed
Uniformiteit sortering	Redelijk uniform
Kiemrust	Gemiddeld
Diepte van de ogen	Iets diep
Grootte van de knollen	Gemiddeld tot grof
Drogestofgehalte	20,5 (360)
Opbrengst	Hoog
Kooktype	AB

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas	Matig gevoelig
Blauwgevoeligheid	Matig gevoelig
Groeischeuren	Matig gevoelig
Rooibeschadiging	Weinig gevoelig
Grondtype	Geen voorkeursgrond

Resistenties

Virus -Bladrol	Weinig gevoelig
Virus- Yn	Matig gevoelig, goed zichtbaar
Virus -Yntn (Knol)	Weinig gevoelig
AM RO 1/4	Resistent (9)
AM RO 2/3	Resistent (9)
AM RO 5	Resistent (9)
AM PA 2	Resistent (9)
AM PA 3	Resistent (8)
Wratziekte	Fysio 1,2/6 en 18 resistent (9)
Metribuzin voor opkomst	Weinig gevoelig
Metribuzin na opkomst	Matig gevoelig
Kringerigheid	Weinig gevoelig
Phytophthora loof	Matig gevoelig
Phytophthora knol	Matig gevoelig
Zilverfurf	Matig gevoelig
Fusarium	Matig gevoelig
Schurft	Matig gevoelig
Poederschurft	Matig gevoelig
Zwarte Spikkel	Weinig gevoelig

Advies (pootgoed)

Stikstof	Standaardadvies -20%
Fosfaat	Standaardadvies
Kalium	Standaardadvies
Sporenelementen	Standaardadvies (Gebruik is aan te bevelen)
Talent	+/-
Ethyleen	+/-
Voorkiemen	--
Afkiemen	--
Bewaardadvies	+/- 5-7 graden Celsius
Plantafstand 28/35	80.000/ha (16.6 cm)
Plantafstand 35/55	66.666/ha (20 cm)
Plantafstand 55/65	50.000/ha (27 cm)
Pootdiepte	Maaiveld diepte